

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

®



Edition
Grandes Cultures

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION CENTRE

BULLETIN TECHNIQUE N° 33

8 Décembre 1994

CEREALES : Encore des pucerons avec le temps doux. Observez une dernière fois vos parcelles.

MAIS : Situation Pyrale à l'automne 1994.

*** CEREALES *****STADE :**

Les orges les plus avancées sont en plein tallage. Les derniers blés sont à 2-3 Feuilles.

PUCERONS ET JNO :**Pourcentage de pieds avec Pucerons**


Lieu	Stade	%
Eure et Loir		
Chartres	2 F	2
Sours 1	2-3 F	0
Sours 2	3 F	2
Berchères les Pierres	3 F	8
Le Hasard	2-3 F	6
Allones	3 F	0
Villereau	4 F	0
Mervilliers	d. tallage	0
Poupry	2-3 F	0
Harville	d. tallage	0
Bonneval	3 F	7
Indre et Loire		
Neuvy le Roi 1	2 F	0
Neuvy le Roi 2	3 F	6
Monnaie	tallage	2
Reugny	tallage	0
Truyes	2 F	7
Chanceaux-Loches	tallage	55
Loir et Cher		
Blois	2-3 F	0
Fossé	d. tallage	0
La Chapelle Vendomoise	d. tallage	30
Champigny en Beauce	d. tallage	12
Loiret		
Ormes 1	d. tallage	23
Ormes 2	d. tallage	13
Gidy 1	2-3 F	0
Gidy 2	2-3 F	0
Saran	3 F	17
Vitry aux Loges	d. tallage	35
Le Coudroy	2-3 F	1
Yèvres le Chatel	3 F	11
Dadonville	3 F	5
Intvilliers	d. tallage	6
Amilly	2 F	5
Chevilly	2 F	0

F : feuille - d. tallage : début tallage.

A la faveur des températures douces, le vol de pucerons s'est prolongé cette année jusqu'au début Décembre. Les comptages en parcelles montrent des niveaux d'infestation très variables : de 0 à 50 % de pieds porteurs avec des parcelles assez nombreuses autour de 5%.

Bien que le pouvoir virulifère ait baissé depuis le début Novembre, les pucerons peuvent encore être nuisibles, en particulier sur les derniers blés semés, si l'infestation excède 10 % de pieds porteurs. En effet, si l'hiver reste doux, les pucerons peuvent encore se multiplier.

Aucune vague de froid n'étant annoncée, il est préférable de faire un traitement de nettoyage sur les parcelles atteignant le seuil de 10 % de pieds porteurs.

**Captures de *Rhopalosiphum padi*
à la Tour à succion de Fleury les Aubrais**
**SITUATION MALADIES :**

Le temps doux et humide depuis un mois continue de favoriser le développement des maladies, en particulier l'Oïdium ; par ailleurs, la Rouille brune est notée fréquemment en Indre et Loire.

Tout fongicide est vivement déconseillé. Des expériences menées par le passé par la Protection des Végétaux n'ont jamais permis de mettre en évidence un intérêt quelconque à des traitements aussi précoces.

direction régionale de l'agriculture et de la forêt

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX CENTRE
93, rue de Curambourg - BP 210 - 45403 FLEURY LES AUBRAIS Cédex
Tél. 38.86.36.24 - Fax 38.84.19.79




ABONNEMENT ANNUEL : 260 F



*** MAIS ***

PYRALE :

SITUATION PYRALE A L'AUTOMNE 1994
NIVEAU D'INFESTATION EN NOMBRE DE LARVES/CANNE
 (comptage réalisé sur 50 cannes)



*Nous remercions tous les abonnés qui ont bien voulu contribuer
 à l'établissement de cette carte en répondant au questionnaire*

Nous constatons la présence assez fréquente d'infestations proches d'1 larve par pied et quelques situations nettement supérieures, en particulier Château La Vallière (37) : 4 larves par pied.

Dans les secteurs où l'infestation est supérieure à 1 larve par pied, on peut d'ores et déjà prévoir un traitement obligatoire l'an prochain.

Suivant les conditions climatiques de l'hiver et du printemps, l'importance du risque pourra être modulée (mortalité des chenilles, bonne réussite de la nymphose,...). L'évolution des surfaces de maïs en 1995 peut également influencer le risque Pyrale.

Compte-tenu des remontées de populations constatées, une attention particulière devra être apportée au suivi de la Pyrale lors de la prochaine campagne.